

Cahier  
technique  
chevêche

LPO Mission Rapaces

Fondation  
Nature et Découvertes**Rappel :**

En 2004, le bilan des 17 centres de sauvegarde donnait le chiffre de 133 chevêches d'Athéna recueillies.

Causes d'accueil :

- 67 ramassages de jeunes,
- 31 routes,
- 6 dénichages actifs,
- 2 chocs d'objets,
- 15 autres causes,
- 11 causes indéterminées.



Comme beaucoup de rapaces nocturnes, les jeunes chevêches quittent souvent le nid avant même de savoir voler ! Il faut donc sensibiliser le grand public, en leur expliquant pourquoi il ne faut pas toucher à ces poussins aventuriers. Un oisillon est rarement abandonné, car même après avoir quitté le nid, les jeunes continuent à être nourris par leurs parents. Il est donc préférable de les laisser sur place en prenant toutefois quelques précautions. On peut, par exemple, les remonter sur une branche, pour les mettre un peu plus en sécurité. En effet, selon les scientifiques, 70 % des chevêches meurent au cours de leur première année. A leur première sortie du nid, les jeunes ne savent pas encore voler. Les quelques jours passés au sol pour les oisillons sont donc les plus mortels.

**Précautions pour les oiseaux blessés**

- Le capturer avec prudence.
- Ne pas le montrer ou l'exhiber pour ne pas lui ajouter du stress.
- L'isoler dans une pièce au calme.
- Ne pas le mettre en cage (risque de blessure) mais l'installer dans un carton percé de trous dans un milieu calme et tempéré.
- Ne pas lui donner à manger ou à boire, car on risque de l'étouffer.

Contactez la fédération des centres de sauvegarde qui vous orientera sur le centre de soins le plus proche de votre commune (adresses pour la France, la Belgique et la Suisse dans la fiche 10, annuaire, du Cahier technique).



Trois jeunes chevêches - photo : C. Fossierat ©